

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE" Arras - Tél. 21.04.21

(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE - SEINE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Alertes Agricoles d'ARRAS.
C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

N° LXXXII - Supplément 1
18 juillet 67

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Depuis la fin-juin, nous observons une assez longue période défavorable à une évolution normale de l'épidémie. De ce fait, une certaine stagnation de la maladie a pu être notée sur l'ensemble des régions, à l'exception toutefois de certaines situations plus favorables (zones littorales plus humides, régions de marais, bas-fonds), où une certaine évolution a cependant pu être remarquée, évolution d'ailleurs faible dans les parcelles convenablement protégées. De plus, les températures extrêmes particulièrement élevées qui ont sévi du 10 au 13 juillet ont contribué, elles aussi, à stopper le déroulement de la maladie. De ce fait, il semble que la quantité d'inoculum restante soit assez réduite actuellement. Une nouvelle succession de cycles de multiplication est maintenant nécessaire pour atteindre un nouveau seuil épidémique qui pourrait se révéler dangereuse en fin de saison.

Dans la pratique, la prudence sera de rigueur en fin de campagne. Des contaminations de tubercules sont toujours à redouter en cas d'évolution tardive de la maladie si l'été venait à être pluvieux.

Dans l'immédiat, aucun traitement ne s'impose sur pommes de terre de variétés précoces maintenant proches de l'arrachage. La destruction des fanes aura pour but principal de faciliter les travaux de récolte.

Sur variétés du type " Bintje ", si aucune évolution grave n'est à craindre dans un proche avenir, il sera prudent de réaliser un traitement fongicide dans les 5 à 7 jours qui suivent des pluies valables (le feuillage doit rester mouillé un minimum de 4 à 6 heures). Là où des pluies orageuses ont été notées le 14 juillet, réaliser le traitement avant les nouvelles pluies. Observer les mêmes recommandations sur pommes de terre féculières. Ne pas réaliser le traitement durant les heures chaudes de la journée afin d'éviter une évaporation trop intense.

TAVELURE DES FRUITS A PEPINS

CULTURES FRUITIERES

De nouvelles taches sont apparues, il y a une dizaine de jours et ceci, même en vergers convenablement traités et ce, à la suite vraisemblablement des violents orages des 24-25 juin. Réaliser une nouvelle intervention en cas de menace de pluie.

OLDIUM DU POMMIER - conditions climatiques toujours très favorables à l'extension de cette maladie. Poursuivre la lutte dans les vergers sensibles.

CARPOCAPSE - TORDEUSE DE LA PELURE - Dans les vergers sujets aux attaques de ces ravageurs, ajouter un insecticide approprié.

ANTHRACNOSE DU HARICOT - Rappel.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

G. CONCE

P. COUTURIER

17